

Patientvejledning

Vandskanning

Undersøgelse af livmoderhulen foretages ved mistanke om polypper og/eller fibromer (muskelknuder) i livmoderhulen, samt til nærmere vurdering af livmoderslimhinden.

Hvordan

Livmoderhalsen afvaskes, og der lægges et tyndt kateter op i livmoderhulen. Samtidig med ultralydsskanning sprøjtes lidt sterilt saltvand ind i livmoderhulen så der fås et nøjagtigt billede af slimhindekonturerne og dermed evt. sygelige processer.

Kateret fjernes. Undersøgelsen varer ca. 5 minutter.

Normale efterforløb

Undersøgelsen kan være forbundet med menstruationslignende smerter i livmoderen, og der kan forekomme lidt vandigt udflåd i timerne efter.

Komplikationer i efterforløbet

Der kan forekomme smerter i maven og i skulderen i op til 1 døgn. Dette skyldes, at der kan blive skyllet lidt blod ud i bughulen sammen med den anvendte væske.

Smerterne forsvinder som regel i løbet af 1-2 timer. Om nødvendigt kan der tages smertestillende, f.eks. Paracetamol tabl. 500 mg, højst 2 tabl. hver 6. time, evt. sammen med tabl. Ipren 200-400 mg.

I tilfælde af vedvarende smerter, ildelugtende/øget mængde udflåd og/eller feber skal Klinikken, egen læge eller 1813 kontaktes.